



Levitra Genérico aquí – www.intogenerics.com/generic/levitra.html

¿Qué es LEVITRA?

Levitra es un nuevo tratamiento oral para la disfunción eréctil. Levitra (vardenafilo) pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de la PDE5. Se trata de una pastilla redonda color naranja que se comercializa en dosis de 5 mg, 10mg o 20mg. Es un medicamento que se toma por vía oral. **No es un afrodisíaco y no incrementa el deseo sexual.** Para que Levitra sea eficaz se requiere estimulación sexual.

¿Cómo funciona LEVITRA?

El mecanismo de acción de Levitra determina que se produzca la relajación de los vasos sanguíneos del pene permitiendo así la entrada de sangre necesaria para que se produzca la erección. Levitra no producirá una erección instantánea, únicamente le ayudará a conseguirla con la estimulación sexual.

¿Cómo se toma LEVITRA?

Levitra está disponible en tres dosis de 5mg, 10mg y 20mg. El médico seleccionará la dosis inicial basándose en la consulta con cada paciente individual.

Levitra es efectivo a partir de los 25-60 minutos, aunque algunos hombres conseguirán una erección a los 15 minutos. Dentro de un espacio de 5 horas tras tomar la pastilla se podría producir una erección en respuesta a la estimulación sexual.

La acción de Levitra no se verá afectada por ingerir alimentos antes de tomar la pastilla (excepto cuando el contenido de grasa de la comida es de 57% o más) o por ingerir alcohol, así que los hombres que tomen este tratamiento pueden comer y beber normalmente antes de tomar Levitra.

Se recomienda solo tomar una dosis de Levitra cada 24 horas.

¿Qué efectos secundarios pueden estar asociados a LEVITRA?

Se han incluido más de 3,750 hombres en ensayos clínicos en todo el mundo para investigar la seguridad de este fármaco. Cuando se toma la dosis recomendada los efectos secundarios son leves y pasajeros. Los efectos secundarios más importantes que se han observado han sido los dolores de cabeza y los sofocos.

¿Qué personas no pueden tomar LEVITRA?

Los pacientes que estén tomando medicinas que contienen nitratos. Estos se recetan a menudo para tratar anginas de pecho. Cuando se combina Levitra con nitratos existe un alto riesgo de hipotensión con consecuencias potencialmente graves. Los pacientes deberían informar a su medico si están tomando estas medicinas o preguntar si no están seguros.

Pacientes con los siguientes perfiles:

- Hipersensibilidad conocida a cualquier componente del fármaco Levitra;
- Hombres con enfermedades cardiacas severas por lo cual no se recomienda actividad sexual;
- Reciente ataque de apoplejía, infarto o baja tensión arterial;
- Angina inestable o angina sufrida durante el coito;
- Mayores de 75 años de edad que estén tomando ritonavir, indinavir, ketoconazol o itraconazol (vía oral)

No se debe tomar Levitra con otros tratamientos para la disfunción eréctil.

¿Que condiciones pueden impedir que un hombre tome LEVITRA?

Los siguientes pacientes deberían tener cautela cuando tomen Levitra:

- Un pene con características anormales.
- Enfermedades que puedan resultar en erecciones prolongadas como anemia de células falciformes, mieloma múltiple o leucemia.
- Un historial medico de hipotensión postural.
- Enfermedades renales o hepáticas severas.

¿Pueden tomar LEVITRA las mujeres?

Las mujeres no deben tomar Levitra ya que no esta autorizado su uso en mujeres y no se ha comprobado su seguridad.

¿Qué ocurre si incremento la dosis?

Un incremento en la dosis siempre debe producirse bajo supervisión médica. Los ensayos clínicos que se han llevado a cabo han demostrado que al incrementar la dosis por encima del máximo recomendado (20mg) únicamente incrementa los efectos secundarios y no la eficacia del fármaco.

¿Puedo conducir mientras estoy tomando LEVITRA?

Durante los ensayos clínicos de Levitra se han registrado mareos y por este motivo los pacientes que estén tomando este medicamento deberían conocer su reacción al fármaco antes de conducir.

¿Funciona Levitra en todos los hombres?

Si Levitra no le ayuda a conseguir una erección o su erección no dura el suficiente tiempo para llevar a cabo la actividad sexual que desee debería comunicárselo a su médico, quien le podrá decir si es necesario incrementar la dosis. Su médico también le puede aconsejar sobre otros posibles tratamientos.

Más información

www.intogenerics.com/generic/levitra.html